

- 本产品以在日本国内进行销售及使用为目的，是经过日本有关保证医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的相关法律认可的医药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。该资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 由于多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。

服用时请务必阅读本说明书。并请妥善保管以便必要时可再次阅读。

ピシヤット®

第②类医药品

止泻药

PISHUT止泻口腔崩解片

特点

- PISHUT止泻OD片是通过盐酸洛哌丁胺直接作用于肠道，抑制肠道蠕动和肠道内的水分分泌来改善腹泻的药物。
- 本品为无水服用的口腔崩解片（OD片剂），入口即化，可在任何地方轻松服用，有效缓解上班、上学或会议途中的突发腹泻症状。
- 对于因饮食过量或睡觉时身体着凉而引起的腹泻，建议您服用每次只需1片即可见效的PISHUT止泻OD片。

⚠ [使用时的注意事项]

禁止事项 ☒

（如不遵守以下事项会造成目前症状的进一步恶化，或容易引发副作用和事故。）

1. 以下人群请勿服用。
 - (1) 曾因本品或本品成分引发过过敏性症状的人士
 - (2) 未满15岁的儿童
 - (3) 患有苯丙酮尿症的人士
(本品含L-苯丙氨酸化合物)
2. 在服用本品期间，请勿服用下列医药品。
肠胃镇痛解痉药
3. 服用后，请勿对车辆或机械类进行驾驶操作。
(可能会出现困倦等情况)
4. 服用前后请勿饮酒。

咨询事项 🗨

1. 以下人群在服用前请先向医生、药剂师或注册销售员咨询。
 - (1) 正在接受医生治疗的人士
 - (2) 腹泻伴随发热的人士、有血便或黏液便持续的人士
 - (3) 患有急性剧烈的腹泻，或腹泻伴随腹痛、腹胀、恶心等症状的人士
(如果用本品强行止泻，反而可能会使疾病恶化)
 - (4) 患有肛门疾病等必须避免便秘的人士
(服用本品可能会导致便秘)
 - (5) 孕妇或可能妊娠的人士
 - (6) 正处于哺乳期的人士
 - (7) 老年人
 - (8) 曾因药物等引发过过敏性症状的人士
2. 服用后，如果出现以下症状则有可能为副作用，请立即停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。

有关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒、浮肿
消化器官	食欲不振、腹痛、恶心、腹胀、便秘、腹部不适、呕吐
神经精神系统	头晕

在极少数情况下可能会出现以下严重症状。如遇这种情况，请立即接受医生的治疗。

(请继续阅读背面的内容)

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等。
皮肤黏膜眼综合征 (史蒂芬斯·强森综合征) 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼垢、嘴唇糜烂、喉咙疼痛、皮肤大范围发疹、发红等症状持续出现或急剧恶化
肠梗阻样症状 (肠阻塞样症状)	出现剧烈腹痛、停止排气(放屁)、呕吐、伴有腹胀的明显便秘

3. 服用后可能会出现以下症状，如发现此类症状持续或加剧，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。
便秘、困倦
4. 连续服用2~3日症状仍无改善时，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。

功效、效果

因饮食过量或睡觉时身体着凉而引起的腹泻

用法、用量

请口服溶解或者用凉开水或温水服用以下剂量。但是，服用间隔需在4小时以上。此外，腹泻停止后请勿服用。

年龄	单次服用量	服用次数
成人(15岁以上)	1片	1天2次
未满15岁	请勿服用	

<关于用法、用量的注意事项>

- (1) 请务必遵守规定的用法、用量(1次1片、1天2次)。
(2) 取出片剂的方法

如右图所示，用指尖用力按压装有药片的PTP板凸出部以刺破背面的铝箔后取出服用(如果直接误服，包装物可能会刺穿食道粘膜等引发不可预料的故事)



成分、分量

● 本品每2片(成人1天的服用量)中含有以下成分。

盐酸洛哌丁胺: 1mg

添加物:

D-甘露醇、硅酸铝镁、羟丙基纤维素、单宁酸、交聚维酮、阿斯巴甜(L-苯丙氨酸化合物)、枸橼酸水合物、l-薄荷醇、香料、硬脂酸镁

保管及使用上的注意事项

- (1) 请保管在阴凉干燥处，避免阳光直射。
(2) 请保管在儿童无法触及的地方。
(3) 请勿转移至其他容器。
(可能会造成误用或变质。)
(4) 请勿使用已过标识使用期限的产品。

发货商

大幸药品株式会社

邮编564-0032 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号

生产销售商

TeiKa制药株式会社

富山县富山市荒川一丁目3番27号